ALLEGATO 1 - Farmaci

FARMACI				
CODICE ATC E PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMACEUTICA	POSOLOGIA-INDICAZIONI	PRECAUZIONI	QUANTITA'
ANALGESICI NON OPIOIDI				
M01AB <u>DIGLOFENAC SODICO</u>	F. i.m. 75 mg/3 ml	Dose i.m. : 75 mg 2 volte al giorno		F.: n° 150
	Cp. 50 mg			Cp.: n° 300
N02BE <u>PARACETAMOLO</u>	Gocce	Adulti: 500mg 2/3 die; dosaggio pediatrico: 0-1 anno 125mg 2/3 volte die		Flac. N° 6
	Sup. 125 mg			Supp. 125 mg, n° 10
ANALGESICI OPIOIDI				
N02AA01 <u>MORFINA CLORIDRATO</u>	F. Iv/Im 10 mg/ml		Sostanza ad azione stupefacente o psicotropa(DPR 390/90 e successive modificazioni)	F.:n° 450
ANALGESICI OPIOIDI				
N05BA01 <u>DIAZEPAM</u>	Soluz. Os. 0,5%, 30 ml	Adulti: 2-10 mg 3-4/die; dosaggio pediatrico: 0,1-0,8 mg/Kg/die		Sol. os n° 25
	F. Iv/Im 15 mg/3 ml	Adulti: 0,07-0,1mg/Kg; dosaggio pediatrico: 0,15-0,20 mg/Kg		F: n°100
N05AX <u>MICRONOAN</u>	Microcismi 10 mg/2.5 ml			n. 20 conf.

CODICE ATC E PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMACEUTICA	POSOLOGIA-INDICAZIONI	PRECAUZIONI	QUANTITA'
ANTIALERGICI				
C01CA24 ADRENALINA	F. im/sc 1 mg/ml Spray 400 dosi	Shock anafilattico: dose adulto. 0,5-1 mg; bambini 6-12 anni: 0,5 mg; bambini 1-5 anni: 0,1 mg per anno di età	Conservare a T° 2-8 °C	F.: n° 150 Fl.: n° 3
H02AB IDROCORTISONE	F. 1 g	Accessi asmatici: dose 4 mg/die; In caso di edema cerebrale, shock di varia natura, traumatismi emorragici, chirurgici, settici, cardiogeni e da ustioni, dose: 32-96 mg/die in 4-6 dosi		F. n° 300
C01CA04 DOPAMINA CLORIDRATO	F. lv 200 mg/5 ml	Stati di shock di varia natura; le F. possono essere diluite in fisologica, glucosata o Ringer	Diluita in soluzione fisiologica, glucosata o Ringer lattato rimane stabile per 24 h	F.: n° 376
ANTIPASTICI				
R03CC02-R03AK04 SALBUTAMOLO	F. lv/im 0,5 mg/ml Aerosol dosato 20 mg 100 mcg/dose	Dose i.m.: 500 mcg, 8 mcg/Kg; Dose inal.: 200 mcg ogni 4-6 h		F. n° 150 Fl. Aerosol: n° 30
ANTIEMIGRANIA E ANTIAGGREGANTI				
N02BA01 ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONATO	Cp. ca. 300 mg	1-2 cp. 2-3 volte al giorno	Non utilizzare in gravidanza	Cp.: n° 60
ANTIBIOTICI				
G02CA49 ISOSSISUPRINA CLORIDRATO	F. lv/im 10 mg/2 ml			F. n° 10

CODICE ATC E PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMACEUTICA	POSIOLOGIA-INDICAZIONI	PRECAUZIONI	QUANTITA'
CARDIOVASCOLARI				
N01BB02 LIDOCAINA CLORIDRATO	F. 2%, 10 ml	Antiaritmico e anestet. locale		F: n° 150
CO1DA08 ISOSORBIDE DINTRATO	Cp sl. 5 mg	Vasodilatatore Dose sublinguale; 2,5-10 mg ogni 2-3 h		Cp. n° 100
CO1DA02 NITROGLICERINA	Spray 0,4 mg/puff, 18 ml	Vasodilatatore Spray orale 0,4 mg/puff dose max 4 puff, 1,6 mg (ha una durata maggiore rispetto alle altre forme farmaceutiche)	Conservazione fiale: 15-30°C, protette dalla luce; Conservazione spray inferiore a 25°C	Spray n° 2
	Fl. iv. 50 mg/50 ml	dose ev. 0,5-0,8mg/h		Fl: n° 30
CO1AA05 DIGOSSINA	F. iv 0,5 mg/2 ml	Antiartimico-nei'insufficienza cardiaca.		F: n° 75
	Gtt. 1 gtt. 0,5% 10 ml			Gtt.: n°16confezioni
CO8CA05 NIFEDIPINA	Gtt. 30 ml 2%	Antipertensivo 10-20 mg 3 volte al giorno		Gtt.: n°20confezioni
CO1EB10 ADENOSINA	F. iv 6 mg/2 ml	Antiartimico-nei'insufficienza cardiaca. Dose iniziale 3 mg iv		F: n° 150
J01CR01 AMPICILLINA SULBACTAM	F. im 1,5 g	Dosaggio adulti: range 3-12 g/die; dosaggio pediatrico: 150 mg/Kg/die	In gravidanza somministrare solo in caso di effettiva necessità	F.: n° 200

CODICE ATC PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMACEUTICA	POSOLOGIA-INDICAZIONI	PRECAUZIONI	QUANTITA'
D06BA01 ARGENTO SULFADIAZINA	Pom. 1%, 180 g	Ustioni		N° confezioni: 30
DERMATOLOGICI: TOPICI-ANTIBATTERICI				
DIURETICI				
C03CA01 FUROSEMIDE	Cp 25 mg	Nell'edema polmonare acuto: dosi di attacco tra 20-80 mg e.v., ripetibili		Cp.: n° 300
	F. iv 250 mg/25 ml			F. n° 25
	F. iv/im 20 mg, 2 ml			F. n° 300
	Sol. os 100 ml, 1%			N° confezioni: 6
COSTITUENTI DEL SANGUE E SOSTITUENTI DEL PLASMA				
B05AA06 POLIGELINA	FI iv 500 ml, 3,5%	Netto shock ipovolemico: 500-1000 ml alla velocità di 20-40 ml/min. Dose max: 20 ml/Kg/die		FI. n° 150

CODICE ATC: PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMACEUTICA	POSOLOGIA-INDICAZIONI	PRECAUZIONI	QUANTITA'
GASTROINTESTINALI				
AO2BC INIBITORI DELLA POMPA PROTONICA	F. IV	Antilucera . In tutte le indicazioni registrate		F.: n° 30
AO3FA01 MECLOPRAMIDE	F. Im/iv 10 mg	Antiemetici . Controllo effetti della morfina. Adulti: 10mg 3 volte al giorno; bambini: 0,5mg/Kg/die/mg/Kg/die	Non utilizzare in gravidanza (induzione contrazioni uterine)	F.: n° 450
AO3BB017 N-BUTILBROMURO DI JOSCINA	F. im/iv 20 mg/1 ml	Antispastici . Dose Im/iv 20 mg, 3 volte al giorno		F.: n° 450
AO7DA03 LOPERAMIDE	Cp. 2 mg	Diarrea acuta : adulti 2 Cp, poi 1 Cp. dopo ciascuna evacuazione (dose max 8 cps); bambini 6-12 anni 1 Cp. Diarrea cronica : adulti 2 Cp./die, bambini 6-12 anni 1 Cp./die.		Cp. n° 750
JO6BB02 IMMUNOGLOBULINE ANTITETANO	F. im 500 U.I./2 ml		T° Conservazione: 2-8°C	F.: n° 150

CODICE ATC PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMACEUTICA	POSOLOGIA-INDICAZIONI	PRECAUZIONI	QUANTITA'
AO10AB01 INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE	Fl. iniet., 100 UI/ml		T° Conservazione: 2-8°C	Fl. n° 30
INSULINA E ANTI-IPERTENSIVI				
AO3BA01 ATROPINA SOLFATO	F. im/iv/sc 0,5 mg/ml	0,4-1,2 mg; nel caso di bradicardia marcata associata ad ipotensione : 0,5-1 mg	T° Conservazione: 2-8°C	F. n° 150
MEDICAZIONE PREOPERATORIA E PROCEDURE PER SEDAZIONE A BREVE DURATA				
MO3AB01 SUXAMETONIOQ	F. i.v. 500 mg/10 ml		T° Conservazione: 2-8°C	F. n° 20
MO3AC01 PANCURONIO	F. 4 mg/2 ml		T° Conservazione: 2-8°C	F. n° 20
MIORILASSANTI E ANTICOLINERGICI				

CODICE ATC PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMACEUTICA	POSOLOGIA-INDICAZIONI	PRECAUZIONI	QUANTITA'
PREPARAZIONI OPHTALMICHE				
<u>S01AA</u> <u>TOBRAMICINA</u>	Pom. Oft. 5 gr. 0,3%	Agenti antinfettivi		N° 10 confezioni
<u>S01HA02</u> <u>OSSIBUPROCAINA</u> <u>CLORIDRATO</u>	Gtt. oft.: 4 mg	Anestetici Locali. Anestesia di superficiale a livello delle mucose; estrazione corpi estranei dalla cornea: 1 gtt. 3-4 volte in 3 min.	Interazioni con: nitrato d'argento, sali di mercurio, sostanze alcaline	N° 30 confezioni
SOLUZIONI INFUSIONALI				
<u>BO5XA02</u> <u>SODIO BICARBONATO 8,4%</u>	Fl. 100 ml	Materiale infrangibile		Fl. n° 50
<u>BO5BA03</u> <u>SOLUZIONE GLUCOSATA:</u> <u>5%</u>	Fl. 500 ml	Materiale infrangibile		Fl. n° 60
<u>BO5BB01</u> <u>RINGER LATTATO</u>	Fl. 500 ml	Materiale infrangibile		Fl. n° 600
<u>BO5XA03</u> <u>SOLUZIONE FISIOLGICA:</u> <u>SODIO CLORURO 0,9%</u>	Fl. 250 ml	Materiale infrangibile		Fl. n° 150
	Fl. 500 ml	Materiale infrangibile		Fl. n° 300
	Fl. 100 ml	Materiale infrangibile		Fl. n° 50
ANTIDOTI				
<u>TOSSICO</u>	<u>ANTIDOTO</u>	<u>POSOLOGIA</u>	<u>NOTE</u>	<u>QUANTITA'</u>
<u>BENZODIAZEPINE</u>	FLUMAZENIL: F. 1 mg/ml	Dose iniziale 0,2 mg		Fl. n° 20
<u>OPPIACEI</u>	NALOXONE: F. iv 400 mcg	Problemi respiratori legati all'uso della morfina. Dose iniziale 800mcg		Fl. n° 20

ALLEGATO 2 - Disinfettanti

DISINFETTANTI E ANTISEPTICI					
PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO DISPONIBILE	INDICAZIONI APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	NORME DI CONSERVAZIONE	AVVERTENZE
ACQUA OSSIGENATA 10 VOL.					
<u>CLOREXIDINA</u>	Soluzioni da diluire 20%, 5% in acqua; spazzoline imbevute con clorexidina	<p>Concentrazioni d'uso 0,05%. Usi: a) Pulizia antisepsi mani e cute del paziente: clorexidina</p> <p>4%+detergente, tempo di applicazione 1'-5'. b) Antisepsi cute deterosa: clorexidina 0,5%+alcol 70%. c) Antisepsi ferite e ustioni: clorexidina 0,05%. d) Lavaggi vescicali: clorexidina 0,02%. e) Pulizia antisepsi esterna in ostetricia, ginecologia, urologia: clorexidina 1%+cetrime. f) Pulizia antisepsi ferite sporche: clorexidina+cetrime 3,3%. <u>Disinfezione:</u> clorexidina+sali di ammonio quaternario per la disinfezione di superfici e oggetti non critici</p>	<p>Attiva tra pH 5,5-8; trova maggior impiego in antisepsi. Associata ad un tensioattivo (es. cetrime) è più stabile. L' alcool etilico ne potenzia l'attività</p>	<p>Conservare in recipienti opachi ben chiusi ; le soluzioni diluite possono essere contaminate, devono essere utilizzate entro 7 giorni</p>	<p>Viene inattivata da saponi e detergenti anionici. La cellulosa (es. filtri) assorbe clorexidina. Le sostanze organiche ne riducono l'attività.</p>

DISINFETTANTI E ANTISEPTICI					
PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTI DISPONIBILI	INDICAZIONI APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	NORME DI CONSERVAZIONE	AVVERTENZE
<u>ALCOOLETILICO</u>	70% p/p, 80% v/v	<u>Antisepsi</u> : sfregamento mani per 1'; potenza l'attività della clorexidina. <u>Disinfezione</u> : di medio livello per oggetti semicritici o critici; per le sue proprietà solventi viene utilizzato su superfici lisce o dure			Inflammabile
<u>IODOPOVIDONE</u>	Concentrazioni tra 5-10% (quota di iodio disponibile 0,5-1%)	<u>Antisepsi</u> : soluzioni al 7,5% per lavaggio antisettico e chirurgico delle mani, tempo di applicazione 2'-5', soluzioni al 5% per antisepsi preoperatoria su cute integra, antisepsi mucose e cute lesa; lavaggi intraperitoneali. <u>Disinfezione ambientale</u> : trattamento di superfici ed oggetti nelle aree a rischio	Agente bloccata a rapida azione e ampio spettro. Presenta maggior attività in soluzioni acide o neutre e in soluzioni alcooliche. La temperatura (entro 40°C) favorisce la liberazione di iodio. Nelle soluzioni a concentrazione maggiore del 10% la quota di iodio libera diminuisce.		Incompatibilità con acetone e acqua ossigenata. Non deve essere utilizzato sui neonati

DISINFETTANTI E ANTISEPTICI					
PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTI DISPONIBILI	INDICAZIONI APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	NORME DI CONSERVAZIONE	AVVERTENZE
IPOCLORITO DI CALCIO	Polvere con contenuto di cloro disponibile 20-40%; soluzione acquose 1:5 con titolo di cloro disponibile 6%	Decontaminazione di feci e urine; azione rapida ma breve. Potabilizzazione acque; è preferibile utilizzare la Cloramina T, derivato organico del cloro perché ha una azione più lenta e più prolungata. Disinfezione ambientale: 200-250 ppm per superfici o oggetti già detersi; 1.000 ppm per superfici che non hanno subito gravi contaminazioni; >10.000 ppm oggetti contaminati con sangue.	Le soluzioni acquose sono fortemente alcaline e poco stabili	Le soluzioni acquose di ipoclorito vanno preparate al momento dell'uso	

DISINFETTANTI E ANTISEPTICI					
PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTI DISPONIBILI	INDICAZIONI APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	NORME DI CONSERVAZIONE	AVVERTENZE
DERIVATI FENOLICI	Associazioni polifenoliche a diverse concentrazioni	Antisepsi: lavaggio antisettico mani. Disinfezione: livello intermedio-basso, impiego in aree non-critiche (10') o semicritiche (20'). Disinfezione ambientale: pavimenti, pareti, armadi. Decontaminazione: lavaggio di strumenti contaminati da HIV.	Presentano attività biocida quasi specifica, ogni derivato fenolico ha un suo spettro di attività, per questo nella pratica vengono utilizzate associazioni polifenoliche. Sono più attivi a pH neutro-acido		Incompatibilità con detergenti cationici. Vengono assorbiti da materiale poroso

DISINFETTANTI E ANTISEPTICI					
PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTI DISPONIBILI	INDICAZIONI APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	I NORME DI CONSERVAZIONE	AVVERTENZE
<u>ACIDO PERACETICO IN POLVERE</u>		Dispositivo medico per la disinfezione dei dispositivi medici riutilizzabili. La polvere attiva è in grado di originare soluzioni disinfettanti per dispositivi medici quali strumenti chirurgici, inclusi quelli di impiego odontoiatrico, dispositivi medici a fibre ottiche quali endoscopi, broncoscopi, laparoscopi, tubi respiratori, apparecchi di anestesia	Va diluito con acqua di rubinetto al momento dell'uso, secondo i dosaggi sottindicati: 5 g per litro di acqua a temperatura 28°-30° C per ottenere soluzioni disinfettanti ad alto livello; 20 g per litro di acqua tiepida (38°C circa) per ottenere soluzioni sterilizzanti. Attendere da 10 a 30 minuti (azione sterilizzante) per consolidare l'attivazione, dopo i quali si può usare la soluzione. L'azione disinfettante si esplica per tempi di contatto fra i 5 e i 10 minuti.	Conservare in recipienti ben chiusi. La soluzione ha effetto anticorrosivo, anticalcare e antiridessificante. Le superfici dei dispositivi medici disinfettati rimangono inalterate anche dopo i ripetuti trattamenti.	Le soluzioni non sono pericolose e non emettono vapori tossici ed irritanti. Evitare il contatto con gli occhi. La soluzione è un composto altamente biodegradabile e pertanto non crea alcun problema nello smaltimento delle soluzioni disinfettanti esauste.

ALLEGATO 3 - Dispositivi medici

SET STRUMENTARIO MONOUSO		QUANTITA' PER PMA
DESCRIZIONE ARTICOLO	FORMA MISURE	
ABBASSALINGUA MONOUSO LEGNO		50
AGOCANNULA	14 G	300
	18 G	200
	20G	200
	22 G	200
AMBU+SET MASCHERINE (COMBIBAG PER ADULTI E BAMBINI)		5+5
APPARECCHIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA+STRISCE		1
ASPIRATORE MEDICALE DI SECRETI	SET CANNULA: media, mini, pool/R.	5
ASSORBENTI IGIENICI		50
BACINELLE RENIFORMI MONOUSO		150
BARELLA A CUCCHIAIO CON CINTURE DI SICUREZZA		5
BARELLA D'EMERGENZA		5
BENDA GARZA T.12/8 ORLATA	h 10 cm circa	300
BENDE OCULARI NON STERILI	h 10 cm circa	300
BISTURI MONOUSO STERILE		200
BOBINE CARTA ASCIUGAMANI	Lama 11	50
	Lama 20	50
	300 m	5
BOMBOLE O ₂ DA L. 20		5
BORSA CALDO INSTANTANEO		50
CAMICE CHIRURGICO STERILE	XL	50
	N° 2	50
	N° 3	50
	N° 4	50
CANNULA GUEDEL MONOUSO		50
CARDIOMONITOR DEFRIBILLATORE		1

DESCRIZIONE ARTICOLO	FORNITURE	QUANTITA PER PIA
CARTELLINI PER TRIAGE		200
CATETERE TORACICO	Con mandrino CH. 16	50
	Con mandrino CH. 20	50
CATETERE VESICALE FOLEY LATTICE	CH 16	50
	CH 18	50
	0.00	10
	0	10
CATGUT STERILE CON AGO	1	10
	2	10
	h 10 cm circa	150
CEROTTI TELATI	Adulti pediatrici	30
COLLARE CERVICALE		150
COMPRESSA OCULARE STERILE ADESIVA		300
COPERTA ISOTERMICA		100
COTONE GESSI IN RULLO	20 cm	5
COTONE IDROFILO	1.000 g	1
DEFIBRILLATORE		300
DEFUSSORE FLEBOCLISI C/ROLLER		150
ELETTRODI PER CARDIOMONITOR		50
FILI DI SETA CON AGO		20
FILTRI E TUBI CORRUGATI		3
FORBICE DA MEDICAZIONE		5
FORBICE PER TAGLIO ABITI		500
GARZA STERILE T. 12/8 16 STRAT.	18 X 40 cm	10 kg
GARZE NON STERILI	20 cm X 20 cm	2000
GUANTI LATTICE	Media	2000
	Grande	2000
IMMOBILIZZATORE PER SPALLA-BRACCIO	L	30
	XL	30
KIT CRICOTOMIA		50
LACCIO EMOSTATICO		5
LACCIO EMOSTATICO DI ESMARK O MARTIN		5

MAGLIA TUBOLARE	8 cm	5 CONFEZIONI
LANCETTA PUNGIDITO STERILE	10 cm	5 CONFEZIONI
LENZUOLO IN TELA MONOUSO		150
MAGNETE PER ESTRAZIONE CORPI ESTRANEI FERROSI		2
MASCHERA OSSIGENOTERAPIA+ DILUITORE		50
MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO		300
MASCHERINE ANTIBATTERICHE I E II LIVELLO		200
MATERASSINO A DEPRESSIONE		3
PADELLA MONOUSO		30
PANNOLONI RETTANGOLARI PER INCONTINENTI		100
PIASTRE PER DEFIBRILLAZIONE SEMIAUTOMATICA E PACING		50
PAPPAGALLO MONOUSO		30
RASOIO MONOUSO PER TRICOTOMIA		50
RUBINETTO A TRE VIE STANDARD		50
SACCA PER LIQUIDI ORGANICI	2.000 ml tubo 130 cm	50
SACCA PER RECUPERO SALME		150
SACCHETTI RISERVA ASPIRATORE		30
SATURIMETRO		5
SCATOLE PORTARIFIUTI A RISCHIO		50
SET PER INTUBAZIONE		5
SFIGMOMANOMETRO A MERCURIO / MECCANICO		5
SIRINGA PLASTICA INSULINA STERILE	100 U/ ml	50
SIRINGA PLASTICA C/CATETERE	50 ml	50
SIRINGA PLASTICA STERILE	2,5 ml 22 G	300
	5 ml 22 G	300
	10 ml 21 G	300
	K30	50
	K31	50
	K32	50
		50
SONDINO NASOGASTRICO		150
SONDINO PER ASPIRAZIONE MONOUSO		150
STECHE DI ZIMMER		150
STECHE METALL. IMBOTT. PER DITA	50 cm	150

STERI-STRIP	6 mm X 100 mm	200
	6 mm X 75 mm	200
STETOFONENDOSCOPIO		5
TELO STERILE	70 X 180 cm	50
TELO DA TRASPORTO		30
TERMOMETRO CLINICO		15
TUBI ENDOTRACHEALI		50
KIT PER CHIRURGIA		
	1 PINZA ADSON CHIRURGICA	
	1 FORBICE MAYO	
	1 PORTA AGHI MAYO	
	2 MOSQUITO	
	4 GARZE	
	2 GUANTI	
	1 TELINO	
	1 PINZA STANDARD CHIRURGICA	
	1 FORBICE MAYO	
	1 MOSQUITO	
	3 GARZE	
	2 GUANTI	
	1 TELINO	
	1 PINZA THUMB ANATOMICA	
	1 PINZA STANDARD CHIRURGICA	
	1 FORBICE MAYO	
	1 PORTAGHI MAYO	
	1 KOCKER	
	6 GARZE	
	2 GUANTI	
	1 TELINO	
KIT PER MEDICAZIONE		
KIT PER PRONTO SOCCORSO		
		100 PEZZI
		100 PEZZI
		100 PEZZI

ALLEGATO 4 - Attrezzature logistiche

ATTREZZATURE LOGISTICHE			QUANTITA PER PAZIENTI
DESCRIZIONE ARTICOLO	FORME MISURE	CLASSIFICAZIONE	PER 50 PAZIENTI BARELLATI
TENDE TIPO TUNNEL			
BRANDINE PIEGHEVOLI			N° 50
GRUPPO ELETTROGENO	3 Kw		1
TANICHE PER GASOLIO			
CAVI E LAMPADE PER ILLUMINAZIONE TENDE			
TELEFONO CELLULARE CON CARICABATTERIA			1
SEDIE PIEGHEVOLI			2
TAVOLINI PIEGHEVOLI			2
PENNE BIRO, BLOCCO NOTES, PENNARELLI INDELEBILI			
SCHEDE TRIAGE			200
CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI (TIPO HALIBIX)			10
CONTENITORI PER RIFIUTI TAGLIENTI			10
MEGAFONO			1
ROTOLO NASTRO DI DELIMITAZIONE			1
TANICHE ACQUA POTABILE	20 LITRI		10
BICCHIERI DI PLASTICA			200
VIVERI AD ALTO CONTENUTO ENERGETICO	PER 3 GIORNI		PER 20 PERSONE
CASCHI CON LAMPADA FRONTALE			20
GUANTI DA LAVORO			20 PAIA
TORCE ELETTRICHE RICARICABILI			5
BATTERIE DI RISERVA PER LUCI FRONTALI E MEGAFONO			
FUMOGENI DI SEGNALAZIONE			10
SET UTENSILI	ACCETTA, GUANTI ANTIACIDO, ACCENDINO, FIAMMIFERI		

03A07944